

男性の方へ



全身にできものが出るがしばらくすると消える

キス・フェラチオでもうつる



脱毛も症状のひとつ




梅毒からあなたを守るために...

かまれてできたできものこの体液が自分の粘膜やキズ口にふれるとうつる

東京都における男女別梅毒患者報告数推移

2021年はまた増加しています



東京都ではここ数年で感染者が急増。

症状が出てくる時期

検査できるのは心配な行為があったから約4週間以降です。

感染後

性器・肛門・口・皮膚などに、かゆくも痛くもない

約3週間～ただれ、くじくくじゅした、ふちが硬いできもの

- ・くじくくじゅした液が皮膚にぶつかるとうつります。
- ・唇にできるヘルペスに似ていることもあります。
- ・足の付け根の部分のリンパ節ははれることもあります。
- ・薬を飲まなくても症状が消え、次の症状にうつります。

数ヵ月～

リンパ節ははれる、発熱、だるさ、関節痛
バラ疹(バラの花びらのようなピンク色や薄赤色の発疹)

- ・梅毒の菌が血液に入り全身に症状が広がります。
- ・全身にバラ疹というできものがでることもあります。手のひらや足の裏にしやすい特徴があります。
- ・薬を飲まなくても消えます。
- ・症状はなくても皮膚や体の中で病気は静かに進んでいきます。


数年～

脳や神経、心臓や血管に異常

治療しないまますぎると

- ・皮膚や筋肉、骨などにゴムのようなしこり(ゴム腫)ができることがあります。
- ・認知症のような症状がでることがあります。
- ・手足の麻痺、心臓や血管の病気、目が見えなくなるなど悪化すると、死にいたることもあります。

年齢階級別・性別報告数 (2020年計1579人)



男性全体の8割は20～40代です。


相手から自分にうつる行為



● 菌が侵入する場所

このような行為から菌が自分の身体に入っていきます。

のどや膣、直腸など、目に見えないところにあるできものから梅毒の菌がでていいることもあります。



● 梅毒の菌がいる場所

予防と対策

粘膜と皮膚からうつるのを防ぐ

自分の目・鼻・口・のど・性器・肛門などの粘膜やキズ口に、相手の血液・膣分泌液・だ液・体液が付かないようにしましょう。

コンドームはフェラチオのときも!!

膣・肛門・口のどこに挿入するときも、最低限コンドームは感染予防のために着けましょう。

うがい薬の効果はありません

相手がうがいをしても梅毒の菌の殺菌にはなりません。


クニリングスでもうつる!!

クニするときには、ラップや切り開いたコンドームをあててなめるようにしましょう。

パートナーも治療をすることが大切!


自分が治療してもパートナーが治療しなければ、パートナーから再感染することがあります。パートナーと一緒に治療しましょう。

自分が相手にうつす行為



● 梅毒の菌がいる場所

このような行為から菌が相手の身体に入っていきます。



● 菌が侵入する場所

検査

保健所

都内保健所、検査・相談室では、HIV検査と一緒に、梅毒などの検査も受けられます。お名前もお金も必要ありません。

病院

症状がある場合は病院を受診しましょう。



感染しているかどうかは、血液検査をしないとわかりません。

治療

薬

抗生物質の薬であるペニシリンを1日3回飲みます。

費用

●健康保険を使う場合
(例)4週間の服用と検査費用で自己負担約7,000円(1日約230円くらい)



きちんと治すためには、検査を受け早く治療を受けることが重要です。

梅毒検査が受けられるところ

都内保健所、検査・相談室

HIV検査と同時に、匿名・無料で受けられます。



東京都性感染症ナビ

病気の知識と検査・相談についてがわかります。

